



ยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน

ฉบับแก้ไข กรกฎาคม 2567



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน

อาการ/โรค/กลุ่มโรคที่ใช้	ชื่อยาสมุนไพรทดแทน	ยาแผนปัจจุบัน
ลดไข้ ไอ เจ็บคอ ติดเชื้อโควิด (Viral infection)	ยาฟ้าทะลายโจร	ยาบรรเทาอาการไข้ เจ็บคอ ใน Viral infection
อาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ (Dyspepsia)	ยาขมิ้นชัน	Omeprazole
ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ	ยารัตูอบเชย	Anti-Flatulence
ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด	ยาขิง	Anti-Flatulence
ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมาเรือ	ยาขิง	Dimenhydrinate
บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ	ยาประสะมะแว้ง	ยาบรรเทาอาการไอ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ	ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	ยาบรรเทาอาการไอ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ	ยาตรีฟลา	ยาบรรเทาอาการไอ
บรรเทาอาการท้องผูก	ยามะขามแขก	Bisacodyl
อาการปวดเมื่อยร่างกาย กล้ามเนื้ออักเสบ	ยาแกววัลย์เปรี๊ยะ	NSAIDs
ยาใช้ภายนอก แก้ปวด บวม พกเข้า เคล็ดยอก	ยาโพล	Balm, NSAIDs gel
บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ (musculoskeletal pain)	เจลพริก	Balm, NSAIDs gel
ยาใช้ภายนอก แก้ปวด บวม พกเข้า เคล็ดยอก (ใช้ได้ ใน OA knee, ปวดตึงกล้ามเนื้อ (Office Syndrome))	ยาประคบ	Balm, NSAIDs gel
ริดสีดวงทวาร	ยาผสมเพชรสังฆาต	Daflon
คลายกล้ามเนื้อ	ยาแก้ลมแก้เส้น	Muscle relaxant
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	เจลว่านหางจระเข้	Silver sulfadiazine
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	ครีมบัวบก	Wound healing agent
บรรเทาอาการของเริมและงูสวัด, แผลในปาก, อาการผดผื่นคัน, สัมผัส, อาการอักเสบ, ปวด, บวมจากแมลงกัดต่อย	ครีมพณายอ, กลีเซอรีนพณายอ, คาลาไมน์พณายอ	Acyclovir cream, TA oral paste, Calamine lotion
อาการปวดเมื่อยร่างกาย กล้ามเนื้ออักเสบ	ยาสหิศราร	NSAIDs

อาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ จาก Viral infection

สารสำคัญ : andrographolide และอนุพันธ์

ขนาดและวิธีใช้

ไข้หวัด : ชนิดพบบด รับประทานครั้งละ 1.5 - 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ชนิดสารสกัด รับประทานในขนาดที่มี andrographolide 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน
โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง หลังอาหาร เป็นเวลา 5-7 วัน

โควิด-19 : ชนิดพบบดและสารสกัด รับประทานในขนาดที่มี andrographolide
ขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

ความเป็นพิษต่อตับ ไต :

อันตรกิริยาระหว่างยา :

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร

ไม่พบความเป็นพิษต่อตับและไตในขนาดที่ใช้ในการรักษา

● ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม เช่น warfarin, ยากลุ่ม NOACs
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด

● ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

● ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450
(CYP450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4

อาการไม่พึงประสงค์ :

อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้
เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้

ใช้

ยา
ฟ้าทะลายโจร

na11nu

ยาบรรเทาอาการ
ไข้ เจ็บคอ จาก
Viral infection

ฉบับแก้ไข
กรกฎาคม 2567

อาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ (Dyspepsia)

สารสำคัญ : curcuminoids
และน้ำมันหอมระเหยง่าย

ขนาดและวิธีใช้

รับประทาน ครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

ความเป็นพิษต่อตับ ไต :

อันตรกิริยาระหว่างยา :

ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้

ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก

ไม่พบรายงานความเป็นพิษ

● ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด

● ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP450) เนื่องจากสาร curcumin
ยับยั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP2A6

● ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin,
chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin
เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

อาการไม่พึงประสงค์ :

ผิวหนังอักเสบจากการแพ้

ใช้

ยา
ขมิ้นชัน

na11nu

Omeprazole

ฉบับแก้ไข
กรกฎาคม 2567

ขับลม บรรเทาอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ

ใช้

ยารัตู อบเชย

na1nu

Anti-flatulence

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต
- ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษต่อตับและไตได้
- อันตรกิริยาระหว่างยา : ไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยารัตูอบเชยกับยาอื่น

อาการไม่พึงประสงค์ : -

ขับลม บรรเทาอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ

สารสำคัญ : shogaols และ gingerols

ใช้

ยาขิง

na1nu

Anti-flatulence

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม หลังอาหาร

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ผู้ป่วยโรคนี้่วในถุงน้ำดี เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
- ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ
- อันตรกิริยาระหว่างยา : ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
- อาการไม่พึงประสงค์ : อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร ระคายเคืองบริเวณปากและคอ

ป้องกันและบรรเทา อาการคลื่นไส้ อาเจียน

ที่มีสาเหตุจาก
การเมาเรือ

สารสำคัญ : shogaols และ gingerols

ใช้

ยาชิง

นาแลน

Dimenhydrinate

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานวันละ 1 - 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที - 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ผู้ป่วยโรคนี้วในถุงน้ำดี เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ
อันตรกิริยาระหว่างยา : ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
อาการไม่พึงประสงค์ : อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร ระคายเคืองบริเวณปากและคอ

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ใช้

ยา ประสะมะแว้ง

นาแลน

ยาแก้ไอ

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน

ผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ

ชนิดเม็ดและชนิดลูกกลอน ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใช้อม

ผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ผู้ที่แพ้ส่วนผสมที่เป็นส่วนประกอบของยา
ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ
อันตรกิริยาระหว่างยา : ไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยาประสะมะแว้งกับยาอื่น
อาการไม่พึงประสงค์ : -

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

สารสำคัญ : phenolic compounds,
vitamin C

ใช้

ยาแก้ไอผสม
มะขามป้อม

naaen

ยาแก้ไอ

ขนาดและวิธีใช้

จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมไม่ได้
เนื่องจากมีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลในปริมาณสูง
- ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ
- อันตรกิริยาระหว่างยา : ไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยาแก้ไอผสมมะขามป้อมกับยาอื่น
- อาการไม่พึงประสงค์ : ท้องเสีย

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ใช้

ยาตรีฟลา

naaen

ยาแก้ไอ

ขนาดและวิธีใช้

- ชนิดซอง รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร
ทิ้งไว้ 3 - 5 นาที ดื่มในขณะยังอุ่น เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง
- ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน
รับประทานครั้งละ 300 - 600 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ 3 - 4 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย
- ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ
- อันตรกิริยาระหว่างยา : ไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยาตรีฟลากับยาอื่น
- อาการไม่พึงประสงค์ : ท้องเสีย

บรรเทาอาการท้องผูก

สารสำคัญ : sennoside B และ aloe emodin

ใช้
ยา
มะขามแขก

na11nu

Bisacodyl

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดชง รับประทานครั้งละ 2 กรัม เช่นน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม - 1.2 กรัม ก่อนนอน

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
- ระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease
- ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

ความเป็นพิษต่อตับ ไต : การรับประทานยาในขนาดสูง อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

อันตรกิริยาระหว่างยา : ● อาจทำให้อาการข้างเคียงของยา Digoxin เพิ่มขึ้น เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ การมองเห็นผิดปกติ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วงซึม

- ยากลุ่ม Corticosteroids, Diuretics (loop diuretics และ thiazide diuretics) และยา Theophylline อาจทำให้เกิดอาการไฮโปคาลซีเมีย

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดมวนท้อง ปั่นคัน

อาการปวดเมื่อยร่างกาย กล้ามเนื้ออักเสบ

สารสำคัญ : 3-aryl-4-hydroxycoumarins
และ lupeol, taraxerol, b-sitosterol

ใช้
ยา
เกวาล์ยเปรี๊ยะ

na11nu

ยาแก้ปวด อักเสบ
(NSAIDs)

ขนาดและวิธีใช้

พบบด รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

สารสกัด รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
และควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร

ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ

อันตรกิริยาระหว่างยา : ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยา paracetamol และ diclofenac เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง เวียนศีรษะ และใจสั่น

ยาใช้ภายนอก แก้ปวด บวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก

สารสำคัญ : น้ำมันหอมระเหยง่าย,
(E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)
butadiene (DMPBD)

ขนาดและวิธีใช้

ทาและถูเบาๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : -

อาการไม่พึงประสงค์ : -

ใช้

ครีมไพล

นาลินู

balm หรือ
Diclofenac gel



บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ

สารสำคัญ : capsaicin

ขนาดและวิธีใช้

ทาบริเวณที่ปวด 3 - 4 ครั้ง ต่อวัน

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ capsaicin

อาการไม่พึงประสงค์ : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ใช้

เจลพริก

นาลินู

balm หรือ
Diclofenac gel



ยาใช้ภายนอก แก้ปวด บวม พกง่าย
เคลียดออก ปวดตึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

ขนาดและวิธีใช้

ประคบบริเวณที่มีอาการวันละ 1 - 2 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : -

อาการไม่พึงประสงค์ : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ใช้

ยาประคบ

นาโน

balm หรือ
Diclofenac gel



บรรเทาโรคเลือดจางเรื้อรัง

ใช้

ยาพสม
เพรสังฆาต

นาโน

Daflon

ขนาดและวิธีใช้

สูตรที่ 1 : รับประทานครั้งละ 1.2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที เข้า กลางวัน เย็น

สูตรที่ 2 : รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที เข้า กลางวัน เย็น


ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง

ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ

อันตรกิริยาระหว่างยา : ไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยาพสมเพรสังฆาตกับยาอื่น

อาการไม่พึงประสงค์ : ท้องเสีย มวนท้อง



คลายกล้ามเนื้อ

ใช้

ยาแก้ลม
แก้เส้น

นาโน

ยากลุ่ม
Muscle Relaxant

ข้อบ่งใช้

แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือเท้าชา

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1 - 4 กรัม วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน

ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ไม่พบรายงานความเป็นพิษ

อันตรกิริยาระหว่างยา : ไม่พบข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยาแก้ลมแก้เส้นกับยาอื่น

อาการไม่พึงประสงค์ : วิงเวียนศีรษะ มึนงง คอแห้ง และสับสนกลางอก

แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และแผลเรื้อรัง

ใช้

เจล
ว่านหางจระเข้

นาโน

Silver Sulfadiazine

สารสำคัญ polyuronide, acemannan, และ glycoprotein ชื่อ aloctin A

ขนาดและวิธีใช้

ทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก วันละ 3 - 4 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา : ผู้ที่แพ้ว่านหางจระเข้

อาการไม่พึงประสงค์ : อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้

สมานแผล

สารสำคัญ

medecassic acid, asiatic acid,
madecassoside, asiaticoside

ขนาดและวิธีใช้

ยาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล (หลังทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ)
วันละ 1 - 3 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้พืชในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เช่น ยี่หระ พักซี่ เป็นต้น
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัดเรื้อรังหรือหัด
- ห้ามใช้ในแผลเปิด

อาการไม่พึงประสงค์ : มีรายงานว่าการศึกษาสกัดใบบัวบกชนิดขี้ผึ้งหรือผง อาจทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้

ใช้

ครีมบัวบก

นาโน

wound healing
agent

บรรเทาอาการของเริมและงูสวัด
แผลในปาก อาการผดผื่นคัน ลมพิษ
อาการอักเสบ บวม จากแมลงกัดต่อย

สารสำคัญ

สารกลุ่ม beta-galactosyl diglycerides

ขนาดและวิธีใช้

ทาบริเวณที่มีอาการของเริม งูสวัด แผลร้อนใน ผื่นคัน วันละ 5 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

-

อาการไม่พึงประสงค์ :

-

ใช้

ครีมพวยอ,
กลีเซอรีนพวยอ,
และ คาลาไมน์พวยอ

นาโน

acyclovir cream,
TA oral paste,
calamine lotion

อาการปวดเมื่อยร่างกาย กล้ามเนื้ออักเสบ

ใช้

ยา
สัทธิสารา

นาลินู

ยาแก้ปวด อักเสบ
(NSAIDs)

ข้อบ่งใช้

ข้ออักเสบในเส้น แก้วโรคลมกองหยาบ

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1 - 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวัน เย็น

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา :

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
- ควรระวังการบริโภคในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อย เพปติกและโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน

ความเป็นพิษต่อตับ ไต : ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได้

อันตรกิริยาระหว่างยา : ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์ : ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ปั่นคัน





กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ติดต่อสอบถาม



@DTAM



www.dtam.moph.go.th
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก